

# ***BLOC A 0.0012% DE BRODIFACOUM***

**Bloc paraffiné à 0.0012% (0.012g/kg) de Brodifacoum et 0.01% (0.1g/kg) de Dénatonium Benzoate**

## **FICHE TECHNIQUE**

### **COMPOSITION**

TP14 - Rodenticide anticoagulant

**Matière active :** BRODIFACOUM

**Taux de matière active :** 0.0012%

**Type :** Bloc paraffiné

### **AUTORISATION DE VENTE FANGA B+ BLOC P - FR-2017-0038**

- Professionnels de la lutte contre les rongeurs.

Destiné au traitement à l'intérieur, à l'extérieur autour des bâtiments, en zones ouvertes extérieures, décharges extérieures et déchetteries, égouts (*Rattus Norvegicus*).

- Non professionnels de la lutte contre les rongeurs.

Destiné au traitement à l'intérieur et l'extérieur autour des bâtiments.

Le produit doit être utilisé dans les postes d'appâtage sécurisés.

Le produit est utilisé sur les organismes cibles du stade juvénile au stade adulte.

### **MODE D'ACTION**

Par ingestion répétée.

Anticoagulant.

### **INSTRUCTIONS D'UTILISATION**

#### Usage professionnel

Lire et respecter les informations sur le produit ainsi que toutes les informations qui accompagnent le produit ou celles fournies sur le point de vente avant de l'utiliser.

Avant de placer un appât, faire un diagnostic préalable et une évaluation sur site de la zone infestée pour identifier les espèces de rongeurs, leurs lieux d'activité et déterminer la cause probable ainsi que l'ampleur de l'infestation. Retirer toute nourriture facilement accessible pour les rongeurs (par exemple, des céréales éparpillées ou des déchets alimentaires). Par ailleurs, ne pas nettoyer la zone infestée juste avant le traitement car cela perturbe la population des rongeurs et rend l'acceptation de l'appât plus difficile. Le produit ne doit être utilisé que dans le cadre d'un système de lutte intégrée incluant notamment des mesures d'hygiène et, si possible, des méthodes physiques de contrôle. Le produit doit être placé à proximité immédiate des endroits où une activité de rongeurs a été observée (par exemple, parcours, sites de nidification, parcs d'engraissement, trous, terriers, etc.).

**Juin 2020**

**FT BLOC A 0.0012% DE BRODIFACOUM**

**1/5**

SAS au capital de 40 000€  
R.C. Sens 310 310 594  
APE 8129A

T.V.A Intracommunautaire :  
FR 96 310 310 594 00034  
Agrément ministériel n°  
BO10119

Prévention, lutte, contrôle des organismes nuisibles : **Dératisation, Désinsectisation, Désinfection**-Traitement nids d'hyménoptères (guêpes, frelons...)-Prestations de services 3D: interventions ponctuelles et contrats de maintenance annuels-Respect normes Européennes (mise en place plans de sanitation suivant méthode HACCP-BRC...)-Traitement des bois et charpentes (insectes xylophages uniquement)-Nettoyage et désinfection de locaux insalubres-Enlèvement des encombrants-Formulations de produits biocides à usage rodenticide-Spécialiste du bloc hydrofuge extrudé-Fabrication à façon et à marque-Négoce en gros et vente directe aux particuliers.

Les postes d'appâtage doivent, si possible, être fixés au sol ou à d'autres structures. Les postes d'appâtage doivent être clairement étiquetés pour indiquer qu'ils contiennent des rodenticides et qu'ils ne doivent être ni déplacés ni ouverts. Lorsque le produit est utilisé dans des lieux publics, les zones traitées doivent être signalées pendant la période de traitement et une note expliquant le risque d'empoisonnement primaire ou secondaire par l'anticoagulant ainsi que les premières mesures à adopter en cas d'empoisonnement doit être apposée à proximité des appâts. L'appât doit être sécurisé de façon à ce qu'il ne puisse pas être déplacé à l'extérieur du poste d'appâtage. Placer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques, animaux d'élevage et autres animaux non cibles. Placer le produit à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux, ainsi que des ustensiles ou des surfaces entrant en contact avec ces derniers. Ne pas manger, boire, ni fumer lors de l'utilisation du produit. Se laver les mains et toute zone de la peau directement exposée après avoir utilisé le produit. Si la consommation de l'appât est faible par rapport à l'étendue apparente de l'infestation, envisager de placer des postes d'appâtage à d'autres endroits et d'opter pour une autre formulation d'appât. Si, après une période de traitement de 35 jours, les appâts continuent d'être consommés et qu'aucune réduction de l'activité des rongeurs n'est observée, il convient d'en déterminer la cause probable. Si d'autres éléments ont été exclus, il est probable que vous ayez affaire à des rongeurs résistants: dans ce cas, envisager l'utilisation d'un rodenticide non anticoagulant, le cas échéant, ou d'un rodenticide anticoagulant plus puissant. Envisager également l'utilisation de pièges à titre de mesure de contrôle alternative. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

### Usage non professionnel

Lire et respecter les informations sur le produit ainsi que toutes les informations qui accompagnent le produit ou celles fournies sur le point de vente avant de l'utiliser. Avant d'utiliser des produits rodenticides, envisager la possibilité de recourir à des méthodes de contrôle non chimiques (des pièges par exemple). Retirer toute nourriture facilement accessible pour les rongeurs (par exemple, des céréales éparpillées ou des déchets alimentaires). Par ailleurs, ne pas nettoyer la zone infestée juste avant le traitement car cela perturbe la population des rongeurs et rend l'acceptation de l'appât plus difficile. Les postes d'appâtage doivent être placés à proximité immédiate de l'endroit où l'activité de rongeurs a été observée (par exemple, parcours, sites de nidification, parcs d'engraissement, trous, terriers, etc.). Les postes d'appâtage doivent, si possible, être fixés au sol ou à d'autres structures.

Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât. Placer les postes d'appâtage hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques, animaux d'élevage et autres animaux non cibles. Placer les postes d'appâtage à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux, ainsi que des ustensiles ou des surfaces qui entrent en contact avec ces derniers. Ne pas placer les postes d'appâtage à proximité de systèmes d'évacuation des eaux où ils pourraient entrer en contact avec de l'eau. Ne pas manger, boire, ni fumer lors de l'utilisation du produit. Se laver les mains et toute zone de la peau directement exposée après avoir utilisé le produit. Retirer tout appât restant ou les postes d'appâtage au terme de la période de traitement.

## MESURES DE GESTION DE RISQUE

### Usage professionnel

Si possible, avant tout traitement, informer les passants éventuels (par exemple, les usagers de la zone traitée et ses environs) de la campagne de dératisation. Les informations sur le produit (c'est-à-dire, l'étiquette et/ou la brochure) doivent indiquer clairement que le produit ne doit être délivré qu'à des utilisateurs professionnels formés, disposant d'une certification attestant qu'ils respectent les exigences applicables en matière de formation (par exemple «à l'usage des professionnels formés uniquement»). Ne pas utiliser dans des zones où l'on peut suspecter une résistance à la substance active. Les produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 35 jours sans évaluation du statut de l'infestation

**Juin 2020**

**FT BLOC A 0.0012% DE BRODIFACOUM**

**2/5**

SAS au capital de 40 000€  
R.C. Sens 310 310 594  
APE 8129A

T.V.A Intracommunautaire :  
FR 96 310 310 594 00034  
Agrément ministériel n°  
BO10119

Prévention, lutte, contrôle des organismes nuisibles : **Dératisation, Désinsectisation, Désinfection**-Traitement nids d'hyménoptères (guêpes, frelons...)-Prestations de services 3D: interventions ponctuelles et contrats de maintenance annuels-Respect normes Européennes (mise en place plans de sanitation suivant méthode HACCP-BRC...)-Traitement des bois et charpentes (insectes xylophages uniquement)-Nettoyage et désinfection de locaux insalubres-Enlèvement des encombrants-Formulations de produits biocides à usage rodenticide-Spécialiste du bloc hydrofuge extrudé-Fabrication à façon et à marque-Négoce en gros et vente directe aux particuliers.

et de l'efficacité du traitement. Ne pas alterner l'utilisation de différents anticoagulants d'efficacité comparable ou inférieure aux fins de la gestion de la résistance. Pour une utilisation alternée, envisager l'utilisation d'un rodenticide non anticoagulant, si disponible, ou d'un anticoagulant plus puissant. Ne pas laver à l'eau les postes d'appâtage entre les applications ou les ustensiles utilisés dans les postes d'appâtage. Éliminer les cadavres des rongeurs dans un circuit de collecte approprié.

#### Usage non professionnel

Envisager l'adoption de mesures de contrôle préventives (combler les trous, retirer autant que possible les aliments et boissons éventuels, etc.) pour améliorer l'ingestion du produit et réduire le risque de nouvelle infestation. Ne pas utiliser de rodenticides anticoagulants en guise d'appâts permanents (par exemple, pour éviter toute infestation de rongeurs ou pour détecter l'activité de rongeurs). Le produit doit être utilisé dans les postes d'appâtage sécurisés. L'utilisation de ce produit devrait permettre d'éliminer les rongeurs sous 35 jours. Prévenir le fournisseur du produit en cas de non efficacité du traitement ou contacter un service de contrôle des organismes nuisibles. Rechercher et éliminer les cadavres de rongeurs pendant le traitement, au minimum chaque fois que les postes d'appâtage sont inspectés. Éliminer les cadavres de rongeurs dans un circuit de collecte approprié.

#### DOSES ET FREQUENCES D'APPLICATION

Professionnels	Contre les rats : <b>200g</b> d'appât par point d'appât espacés de <b>5 à 10</b> mètres.
	Contre les souris : <b>40g</b> d'appât par point d'appât espacés de <b>1 à 2</b> mètres.
Non-Professionnels	Contre les rats, intérieur et extérieur : <b>200g</b> d'appât par point d'appât espacés de <b>5 à 10</b> mètres.
	Contre les souris uniquement à l'intérieur : <b>40g</b> d'appât par point d'appât espacés de <b>1 à 2</b> mètres.

Respecter les doses d'application du produit et les intervalles entre les postes d'appâtage.

#### CONSIGNES D'UTILISATION SPECIFIQUES :

##### Usage professionnel

Les postes d'appâtage doivent être inspectés tous les 2 à 3 jours (pour le traitement contre les souris) ou 5 à 7 jours (pour le traitement contre les rats) après le début du traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage sont intacts et de retirer les cadavres de rongeurs. Rechargez le poste d'appâtage au besoin. Envisager l'adoption de mesures de lutte préventives (combler les trous, retirer autant que possible les aliments et boissons éventuels, etc.) pour améliorer l'ingestion du produit et réduire le risque de nouvelle infestation. Pour réduire le risque d'empoisonnement secondaire, chercher et retirer régulièrement les cadavres de rongeurs pendant la période de traitement. Ne pas utiliser le produit en guise d'appât permanent pour éviter l'invasion de rongeurs ou surveiller les activités des rongeurs. Ne pas utiliser le produit dans le cadre de traitements par appâtage pulsé. Ne pas placer directement ce produit dans les terriers. Lorsque des points d'appât sont placés à proximité de systèmes d'évacuation des eaux, s'assurer que l'appât n'entre pas en contact avec l'eau. Protéger l'appât des conditions atmosphériques. Placer les points d'appât dans des endroits qui ne risquent pas d'être inondés. Remplacer tout appât qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés. Pour l'utilisation à l'extérieur, les points d'appâtage doivent être couverts et placés dans des sites permettant de minimiser l'exposition des espèces non cibles. Retirer tout produit restant au terme de la période de traitement.

**Juin 2020**

**FT BLOC A 0.0012% DE BRODIFACOUM**

**3/5**

SAS au capital de 40 000€  
R.C. Sens 310 310 594  
APE 8129A

T.V.A Intracommunautaire :  
FR 96 310 310 594 00034  
Agrément ministériel n°  
BO10119

Prévention, lutte, contrôle des organismes nuisibles : **Dératisation, Désinsectisation, Désinfection**-Traitement nids d'hyménoptères (guêpes, frelons...)-Prestations de services 3D: interventions ponctuelles et contrats de maintenance annuels-Respect normes Européennes (mise en place plans de sanitation suivant méthode HACCP-BRC...)-Traitement des bois et charpentes (insectes xylophages uniquement)-Nettoyage et désinfection de locaux insalubres-Enlèvement des encombrants-Formulations de produits biocides à usage rodenticide-Spécialiste du bloc hydrofuge extrudé-Fabrication à façon et à marque-Négoce en gros et vente directe aux particuliers.

### Usage non professionnel

Placer les postes d'appâtage dans des endroits qui ne risquent pas d'être inondés. Remplacer tout appât dans un poste qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés. Les postes d'appâtage doivent être inspectés tous les 2 à 3 jours (pour le traitement contre les souris) ou 5 à 7 jours (pour le traitement contre les rats) au début du traitement et au moins une fois par semaine après, afin de vérifier si l'appât est accepté, si les postes d'appât sont intacts et pour enlever les corps de rongeurs. Recharger le poste d'appâtage si besoin.

### CLASSIFICATION

Catégorie de danger :           Produit non classé.  
Symbole de danger :           Aucun.  
Mention d'avertissement :   Aucune.  
Mention de danger :           Aucune.

### Conseils de prudence :

**P102** : Tenir hors de portée des enfants.

**P103** : Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.

**P308 + P313** : EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin.

**P314** : Consulter un médecin en cas de malaise.

**P501** : Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale.

### INSTRUCTIONS DE PREMIERS SECOURS :

Ce produit contient une substance anticoagulante. En cas d'ingestion, parmi les symptômes pouvant apparaître, parfois avec un certain retard, figurent des saignements de nez et des saignements gingivaux. Dans certains cas graves, des contusions et la présence de sang dans les selles ou les urines peuvent être observées.

Antidote : Administration de vitamine K1 par du personnel médical/vétérinaire uniquement.

En cas :

-d'exposition cutanée, nettoyer la peau à l'eau puis à l'eau savonneuse;

-d'exposition oculaire, rincer les yeux avec une solution de rinçage oculaire ou de l'eau en gardant les paupières ouvertes au moins 10 minutes;

-d'exposition orale, rincer soigneusement la bouche avec de l'eau.

Ne jamais rien administrer par voie orale à une personne inconsciente. Ne pas provoquer de vomissement.

En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin et présentez-lui le contenant du produit ou l'étiquette BLOC A 0.0012% DE BRODIFACOUM. Contacter un vétérinaire en cas d'ingestion par un animal domestique.

En cas d'incident, contacter le 15 (ou 112)

**Juin 2020**

**FT BLOC A 0.0012% DE BRODIFACOUM**

**4/5**

SAS au capital de 40 000€  
R.C. Sens 310 310 594  
APE 8129A

T.V.A Intracommunautaire :  
FR 96 310 310 594 00034  
Agrément ministériel n°  
BO10119

Prévention, lutte, contrôle des organismes nuisibles : **Dératisation, Désinsectisation, Désinfection**-Traitement nids d'hyménoptères (guêpes, frelons...)-Prestations de services 3D: interventions ponctuelles et contrats de maintenance annuels-Respect normes Européennes (mise en place plans de sanitation suivant méthode HACCP-BRC...)-Traitement des bois et charpentes (insectes xylophages uniquement)-Nettoyage et désinfection de locaux insalubres-Enlèvement des encombrants-Formulations de produits biocides à usage rodenticide-Spécialiste du bloc hydrofuge extrudé-Fabrication à façon et à marque-Négoce en gros et vente directe aux particuliers.

Centre antipoison : INRS 01 45 42 59 59

### **INDICATIONS A PORTER SUR LES POSTES D'APPATAGES**

Chaque poste d'appâtage doit être muni d'une étiquette mentionnant les informations suivantes : « ne pas déplacer ni ouvrir » ; « contient un rodenticide » ; « Nom du produit ou numéro d'autorisation » ; « Substance(s) active(s) » et « en cas d'incident, contacter un centre antipoison INRS 01 45 42 59 59 ». Dangereux pour la faune.

### **CONSIGNES POUR UNE ELIMINATION SURE DU PRODUIT ET DE SON EMBALLAGE:**

Une fois le traitement terminé, éliminer l'appât qui n'a pas été mangé ainsi que l'emballage, dans un circuit de collecte approprié.

### **CONDITIONS DE STOCKAGE DU PRODUIT DANS DES CONDITIONS NORMALES DE STOCKAGE:**

Conserver le produit dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Maintenir le contenant bien fermé et à l'abri de toute exposition directe au soleil. Entreposer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques et animaux d'élevage.

### **AUTRES INFORMATIONS:**

En raison de leur mode d'action retardé, les rodenticides anticoagulants agissent entre 4 et 10 jours après consommation de l'appât.

Les rongeurs peuvent être porteurs de maladies. Ne pas toucher les cadavres de rongeurs à mains nues; porter des gants ou utiliser des instruments tels que des pinces pour les éliminer.

Ce produit contient un agent amérisant et un colorant.

### **CONDITIONNEMENT / PRESENTATION**

#### Non-Professionnels de la lutte contre les rongeurs

- Sachets en polyéthylène ou polypropylène.  
Les produits sont uniquement fournis par paquet contenant la quantité maximale d'appât ci-dessous :
  - a) pour les produits destinés à la lutte contre les souris uniquement : **100g**.
  - b) pour les produits destinés à la lutte contre les rats uniquement ou contre les rats et souris : **300g**.

#### Professionnels de la lutte contre les rongeurs

- Sachets individuels polyéthylène ou polypropylène.

- En vrac.

Dans un contenant de 5 kg minimum.

Lire attentivement la fiche de données de sécurité.

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

**Jun 2020**

**FT BLOC A 0.0012% DE BRODIFACOUM**

**5/5**

SAS au capital de 40 000€  
R.C. Sens 310 310 594  
APE 8129A

T.V.A Intracommunautaire :  
FR 96 310 310 594 00034  
Agrément ministériel n°  
BO10119

Prévention, lutte, contrôle des organismes nuisibles : **Dératisation, Désinsectisation, Désinfection**-Traitement nids d'hyménoptères (guêpes, frelons...)-Prestations de services 3D: interventions ponctuelles et contrats de maintenance annuels-Respect normes Européennes (mise en place plans de sanitation suivant méthode HACCP-BRC...)-Traitement des bois et charpentes (insectes xylophages uniquement)-Nettoyage et désinfection de locaux insalubres-Enlèvement des encombrants-Formulations de produits biocides à usage rodenticide-Spécialiste du bloc hydrofuge extrudé-Fabrication à façon et à marque-Négoce en gros et vente directe aux particuliers.



# RATOUCY

dératisation & désinsectisation

29 Rue de la Forêt - LOOZE  
BP 145 - 89303 JOIGNY Cedex  
T: 03-86-62-41-88  
[ratoucy@ratoucy.fr](mailto:ratoucy@ratoucy.fr)  
[www.ratoucy89.fr](http://www.ratoucy89.fr)

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

*Juin 2020*

*FT BLOC A 0.0012% DE BRODIFACOUM*

*6/5*

SAS au capital de 40 000€  
R.C. Sens 310 310 594  
APE 8129A

T.V.A Intracommunautaire :  
FR 96 310 310 594 00034  
Agrément ministériel n°  
BO10119

Prévention, lutte, contrôle des organismes nuisibles : **Dératisation, Désinsectisation, Désinfection**-Traitement nids d'hyménoptères (guêpes, frelons...)-Prestations de services 3D: interventions ponctuelles et contrats de maintenance annuels-Respect normes Européennes (mise en place plans de sanitation suivant méthode HACCP-BRC...)-Traitement des bois et charpentes (insectes xylophages uniquement)-Nettoyage et désinfection de locaux insalubres-Enlèvement des encombrants-Formulations de produits biocides à usage rodenticide-Spécialiste du bloc hydrofuge extrudé-Fabrication à façon et à marque-Négoce en gros et vente directe aux particuliers.